

## Po obisku klinike

### Vrnitev domov

Ko se bo po bivanju na kliniki vrnila domov, bo vaša mačka morda potrebovala posebno oskrbo



- Če je tisti dan prejela anestezijo, bo morda še vedno nekoliko omamljena in malce negotova pri hoji
  - Če je nervozna in zmedena, ji prigovarjajte in jo ob tem rahlo božajte. Dovolite ji, da se vam približa takrat, ko je na to pripravljena.
  - Ne dovolite ji, da si liže rane ali trga šive. Če pride do tega, prosite veterinarja za mehko ovratnico, ki jo mačka lahko nosi začasno.
  - Pokličite na kliniko, če vas karkoli skrbi, npr. če rana postane rdeča ali zatečena, če pride do gnojenja ali če menite, da mačka ne okreva dobro.
  - Prepričajte se, da redno prejema zdravila, če so ta potrebna.
- Včasih je pri mačkah težko opaziti bolečino, lahko pa prepoznate najbolj pogoste znake, ki na to opozarjajo, npr. izguba apetita, skrivanje ali zadržanost. Če vam karkoli povzroča skrbi, kontaktirajte kliniko.
  - Tudi če je vaša mačka navajena izhodov, je priporočljivo, da jo zadržite doma vsaj prvih nekaj noči.
  - Doma ji priskrbite mirno in toplo mesto, kjer bo lahko počivala.



### Ponovno srečanje z drugimi domačimi mačkami

Med obiskom na kliniki se lahko vaša mačka navzame novih, neznanih vonjav, še posebej, če se obisk podaljša na eno ali več noči. Nove vonjave lahko motijo druge mačke v vašem domu, zato je dobro, da ste previdni, ko jih ponovno seznanjate:



- Bodite prisotni, ko se mačke ponovno srečajo.
- Mačke, ki se je vrnila domov, ne preobremenite s pozornostjo ljudi ali drugih domačih živali.
- Dovolite ji, da se ponovno privadi na domače vonje, preden jo vrnete med druge mačke.
- Po potrebi jih ločite za dan ali dva in jim pustite, da same začnejo s postopnim približevanjem.
- Če ste s klinike prinesli kakršnokoli posteljnino, odeje, blazine, jih takoj operite, da odstranite tuje vonjave.
- Vonjave vaših mačk malce pomešajte med sabo tako, da vsako posebej pobožate, predvsem okrog glave, lahko pa jim tudi izmenjate blazine.
- Na mestih, kjer mačka najraje počiva, lahko uporabite feromonsko razpršilo ali sprej (kot je npr. Feliway®) in ji s tem pomagate, da se bo počutila bolj varno in zaščiteno.

### Hranjenje po vrnitvi domov

Po operaciji vaša mačka morda ne bo jedla. Spodbudite jo lahko na različne načine:

- Hrano segrejte do telesne temperature, če uporabljate hrano v konzervah ali vrečkah.
- Ponudite ji bolj okusno vrsto hrane (npr. hrano za mladiče).
- Na kliniki vam lahko priporočijo posebno vrsto hrane, ki spodbuja apetit in pomaga pri okrevanju.
- Obroki naj bodo majhni, a pogosti, posodico pa med hranjenji umaknite.
- Po potrebi lahko mačko ročno hranite in ob tem nežno božate.
- Hranjenje lahko poskusite spodbuditi tudi tako, da ji na tačko namažete majhno količino hrane.
- Uporabite plitvo posodico za hrano, da se njeni brki ne bodo dotikali robov.
- Če mačka hrano zavrača več kot dan ali dva, kontaktirajte kliniko.



### Ne pozabite

Če vam karkoli povzroča skrbi, kontaktirajte kliniko!