

# STERILIZACIJA MAČKE

VETERINA MH, Bernekerjeva ulica 43, Ljubljana  
059 050 630 ali 040 971 118 | [www.macjahisa-vet.si](http://www.macjahisa-vet.si)

*Sterilizacija mačke je rutinski poseg, pri katerem se mački prepreči nadaljnja reprodukcija. Kako poteka poseg in na kaj morate biti pripravljeni, preden mačko pripeljete na sterilizacijo?*

## Pred posegom

Pred posegom sterilizacije mora biti mačka **12 ur tešča**. Vodo jim umaknemo 2 uri pred posegom. To namreč zmanjša možnost, da bo vaši mački zaradi anestetikov slabo in bi posledično bruhala. Zaradi tega lahko pride do aspiracije bruhanja v pljuča in hudih komplikacij.

Izjema so mladiči, ki jih ne smemo pustiti predolgo brez hrane, saj jim hitro pade nivo krvnega sladkorja. Mladiče postimo 2-4 ure.




Na dan posega mačko najprej pregledamo, da ugotovimo, ali je zdrava in tako primerna za poseg.

Vsaki mački izmerimo telesno temperaturo, poslušamo srce in pljuča, pretipamo trebuh, pregledamo oči, nos, ustno votlino, ušesa in podkožne bezgavke. Mačko stehamo, da lahko izračunamo pravilno dozo anestetikov in drugih zdravil.

Če so pri pregledu ugotovljena odstopanja, lahko poseg tudi prestavimo oziroma svetujemo dodatne preiskave, da bi zagotovili varen poseg

za vašo mačko. Po pregledu ostane mačka pri nas in do posega počaka v kletki.

## Sterilizacija



*Poseg vedno opravljamo v splošni anesteziji.*



*Pred posegom kirurško polje obrijemo in razkužimo.*

©Veterina MH

Pod popkom napravimo majhno zarezo v trebušno votlino, preko katere odstranimo jajčnike. V primeru, da je mačka breja oziroma opazimo spremembe na maternici (gnojno vnetje, tumorji, ciste, ...), odstranimo tudi maternico. V tem primeru je rana malenkost daljša.

Po odstranitvi obeh jajčnikov zašijemo trebušno steno, podkožje in kožo s šivalnim materialom, ki se v 6 tednih počasi razgradi. Tako mačke ni potrebno pripeljati nazaj na odstranitev šivov. Šivi v koži so notranji, tako da se jih na zunanji ne vidi.

### Po posegu

Po posegu na ranico nanesejo zaščitni sprej. Mačko nato damo v kletko in jo zbudimo. Ko je muca budna in v primernem stanju za odhod domov, pokličemo lastnika, da jo odpelje domov. Doma muca lahko takoj je in pije. Nekaj ur je še malo omotična in zaspana. Zaradi vpliva anestezije na regulacijo telesne temperature, je potrebno imeti mačko čez noč v stanovanju na toplem, da se ne podhladi.



*Pod popkom se napravi majhna zareza.*



*Odstranitev jajčnikov.*



*Nanos zaščitnega spreja.*

Zdravil muca ne dobi za domov. Med posegom dobi protibolečinsko injekcijo, ki drži 2 dni. Daljše dajanje ni potrebno, saj je poseg minimalno boleč. Zaščitnega ovratnika mucam ne dajemo, saj si rane običajno ne ližejo. V kolikor se to zgodi, ovratnik namestimo naknadno.

**Komplikacije po posegu so redke**, najbolj pogosto se pripetijo reakcije na šivalni material. V tem primeru se pojavi manjša bulica na mestu sterilizacijske rane, ki v parih tednih počasi izgine. V kolikor si muca rano zliže, se lahko ta vneme. V tem primeru predpišemo antibiotik. Priporočamo, da se vsaj en teden po posegu spremlja sterilizacijsko rano.

V lanskem letu smo na Veterini MH opravili **več kot 2000 sterilizacij in kastracij mačk**. Razen manjših vnetij sterilizacijskih ran nismo zasledili nobenih komplikacij med ali po posegih. Mačke so običajno že isti dan proti večeru oziroma najkasneje naslednji dan v enakem stanju kot pred posegom.